









『大学入試　亀田和久の　化学[有機]が面白いほどわかる本』正誤表

このたびは，小社刊『大学入試　亀田和久の　化学[有機]が面白いほどわかる本』の第1刷の記述につき誤りがありました。

お詫びとともに訂正させていただきます。

最終更新日:2026 年 10 月 2 日

	誤	正
p.16 「官能基の名称」の(その他の基)の上から 2 番目	ヒ**ロ ド**キシ基	ヒ**ド ロ**キシ基
p.49 「構造異性体の例」4 番目の分子式	C_3H_8O	C_2H_6O
p.102 下図右のスポイトを指している赤枠内	KMnO4 水溶液(赤**褐**色)	KMnO4 水溶液(赤**紫**色)
p.111　確認問題 1 (3)の答え	ジイソプロピルエー**エ**ル	ジイソプロピルエー**テ**ル
p.137 アルコールの参加の具体例	エタノール  1-プロパノール  2-プロパノール 	エタノール  1-プロパノール  2-プロパノール 
p.156 Point「カルボン酸とカルボン酸誘導体」		

p.161　ポイント内		
p.162　図内	+C_2H_5OH　エタノール	①+C_2H_5OH　エタノール
p.250　図内	左上の「1−ナフトール」 左下の「2−ナフトール」	左上の「1−ナフトールのナトリウム塩（ナトリウム 1−ナフトキシド」 左下の「2−ナフトールのナトリウム塩（ナトリウム 2−ナフトキシド」
p.254　問題 10	塩基性の 1−ナフトールに低温で	1−ナフトールを塩基性下で低温で
p.352 Point「付加縮合による尿素樹脂の合成」一番下・左の構造式	−N　　N− ｜＼　／｜ H　C　H ‖ O	−N　　N− ｜＼　／ H　C ‖ O
p.355　下から 4 行目、2 行目	$SiCl_2(OH)_2$	$Si(CH_3)_2(OH)_2$
p.366　スチレンブタジエンゴムの図内	$[-CH_2-CH-]_n-[-CH_2-CH=CH-CH_2-]_m-$	$[-CH_2-CH-]_m-[-CH_2-CH=CH-CH_2-]_n-$
p.366　アクリロニトリルブタジエンゴムの図内	$[-CH_2-CH-]_n-[-CH_2-CH=CH-CH_2-]_m-$	$[-CH_2-CH-]_m-[-CH_2-CH=CH-CH_2-]_n-$
別冊 p.24「(4)アルコールの脱水」	160℃～170℃ 分子間脱水▲ 130℃～140℃ 分子内脱水▲	160℃～170℃ 分子内脱水▲ 130℃～140℃ 分子間脱水▲

以　上